

Driss khechaf, institut RSCS, [driss.khechaf@uclouvain.be](mailto:driss.khechaf@uclouvain.be) & le professeur Dominique Jacquemin, RSCS, [dominique.jacquemin@uclouvain.be](mailto:dominique.jacquemin@uclouvain.be) & le professeur Guy Jobin, université Laval, [ftsr@ftsr.ulaval.ca](mailto:ftsr@ftsr.ulaval.ca)

**Résumé:** Les recherches scientifiques qui visent l'intégration de la spiritualité dans les soins, ainsi que son développement augmentent chaque année. Toutefois, des chercheurs ont constaté qu'il existe un manque important dans les recherches concernant la spiritualité des patients adhérant à l'islam. Dans cette optique, notre étude vise à déterminer les besoins spirituels des patients musulmans belges en soins palliatifs en adoptant une approche comparative intergénérationnelle. Cela nous a amené à la question de recherche suivante : existe-t-il un déplacement dans le besoin spirituel des patients musulmans belges de la première et de la seconde génération en soins palliatifs ? Les résultats de notre enquête sont préliminaires.

**Méthode:** Nous avons mené une enquête auprès de 10 patients musulmans en soins palliatifs dans 4 hôpitaux à Bruxelles, en utilisant les entretiens semi-directifs de la grille STIV/SDAT qui modélise la dimension spirituelle des patients en quatre sous-dimensions : le sens - la transcendance - les valeurs - les aspects psycho-sociaux de l'identité.

## Résultats:

### Les patients musulmans de la première génération

	Sans perturbation/ Besoin couvert	Perturbation légère/ Besoin légèrement non couvert	Perturbation moyenne/Besoin moyennement non couvert	Perturbation sévère/ Besoin non couvert	Total
Sens	0	0	5	1	6
Transcendance	3	1	1	0	2
Valeurs	0	3	2	0	5
Aspects psycho- sociaux de l'identité	0	2	2	1	5
Détresse spirituelle	0	3	4	0	7

### les patients musulmans de la seconde génération

	Sans Perturbation/ Besoin couvert	Perturbation légère/ Besoin légèrement non couvert	Perturbation moyenne/Besoin moyennement non couvert	Perturbation sévère/ Besoin non couvert	Total
Sens	0	0	2	4	6
Transcendance	0	4	1	0	5
Valeurs	0	0	4	1	5
Aspects psycho- sociaux de l'identité	0	2	3	2	7
Détresse spirituelle	0	1	5	4	10

**Conclusion:** Les résultats préliminaires montrent que les patients de la deuxième génération présentent des perturbations plus importantes que les patients de la première génération au niveau du nombre et de l'intensité de la perturbation. Ce dernier mot signifie qu'un besoin liée à une sous-dimension de la spiritualité n'est pas couvert.

**Références:** C. AHADDOUR, S. VAN DEN BRANDEN, B. BROECKAERT, « "What Goes Around Comes Around": Attitudes and Practices Regarding Ageing and Care for the Elderly Among Moroccan Muslim Women Living in Antwerp (Belgium) », dans *Journal of Religion and Health*, t. 59, 2020, p.986-1012.

E. ROCHAT, *Modèle d'évaluation de la détresse spirituelle : une appréciation théologique* (thèse de doctorat), Université Laval-Université de Lausanne, 2017, en ligne : <http://serval.unil.ch> (consulté le 15 février 2019).